



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

24/23-5-18

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις:

Η 2^η πτήση του εντόμου ξεκίνησε στις πρώιμες περιοχές (παραλιακή ζώνη Π. Ε Κορινθίας).

Οδηγίες:

Επέμβαση στις ανωτέρω περιοχές, καθώς και σε πρώιμα κλαδεμένους αμπελώνες των μεσοπρώιμων περιοχών, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτ/κά

Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ.

προϊόντα:

Β. Μέχρι τις 26 Μάη με:

Μεθοξυφenoζάντ, Τεμπουφenoζάντ, Χλοραντρανιλιπρόλ, Χλοραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ, Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες.

Γ. Από 27 ως 30 Μαΐου με:

Ακριναθρίν+Αμπαμεκτίν, Άλφα-Συπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εσφενβαλερέιτ, Ετοφενπρόξ, Εμαμεκτίν-μπενζοείτ, Ιντοξακάρμπ, Λάμπιντα-Συαλοθρίν, Μπέτα - Συφλουθρίν, Σπινোসάντ, Σπινετοράμ, Συπερμεθρίν, Τα- Φλουβαλινεϊτ, Χλωρπυριφός - μεθύλ.

Το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται στα σταφύλια και να διασπείρεται στο σύνολο της επιφάνειάς τους. Μια ελαφριά αποφύλλωση είναι χρήσιμη. Η εφαρμογή του ψεκαστικού υγρού να είναι αμφίπλευρη. Η ταχύτητα των ψεκαστικών μηχανημάτων να είναι τέτοια που να επιτρέπει την καλή διασπορά του ψεκαστικού υγρού.

Για τις υπόλοιπες περιοχές θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Διαπιστώσεις:

Οι εκκολάψεις πλησιάζουν στο τέλος και ο περισσότερος πληθυσμός είναι νύμφες πρώτου σταδίου.

Οδηγίες:

Ελέγξτε τα αμπέλια με μεγάλη προσοχή (κυρίως κάτω από τα ρυτιδώματα και πρέμνα που κυκλοφορούν μυρμηγκία). Όπου διαπιστώνετε την ύπαρξη του εντόμου, να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Το ψεκαστικό υγρό να βρίσκει τις αποικίες του εντόμου και καλό είναι να περνάει και μέσα στα ρυτιδώματα. Ο επαρκής αερισμός και ο φωτισμός είναι ανασταλτικοί παράγοντες για το έντομο.

Φυτ/κά

Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ασεταμιπρίντ, Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός - μεθύλ.

προϊόντα:



3.ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ

Οδηγίες: Όπου μετά από έλεγχο διαπιστωθούν προσβολές να γίνει επέμβαση.
Φυτ/κά Άλατα (Κ) λιπαρών οξέων, Αζαντιραχτίν Α, Ακριναθρίν + Αμπαμεκτίν, Άλφα-
προϊόντα: Συπερμεθρίν, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιαμεθοξάμ, Ιντοξακάρμπ, Λάμπντα
συαλοθρίν, Μπέτα σουφλουθρίν, Χλοραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ.

4. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις- Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (τοπικές βροχοπτώσεις) μπορεί
Οδηγίες: να δημιουργήσουν προβλήματα.
Εντείνετε τους ελέγχους για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών και
άμεση επέμβαση.

Φυτ/κά
προϊόντα:

Βλέπε δελτίο Βλέπε δελτίο 12/10-4-18.

5. ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες:

Τα αμπέλια βρίσκονται σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές και
πρέπει να είναι προστατευμένα. Η επέμβαση να είναι σχολαστική και
να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αμπελώνες με ιστορικό προσβολών
και ευαίσθητες ποικιλίες.

Φυτ/κά
προϊόντα:

Βλέπε δελτίο 9/19-3-18.

Για την αποφυγή ή καθυστέρηση δημιουργίας ανθεκτικότητας:

1. Να εναλλάσσονται οι δραστικές ουσίες ανάλογα με τον τρόπο δράσης τους μέσα στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.
2. Να τηρείται ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.
3. Να χρησιμοποιείται η μικρότερη αποτελεσματική δόση εφαρμογής.

6. ΧΑΛΑΖΙ

Οδηγίες:

Μετά από χαλαζόπτωση και μέσα στο πρώτο 24ωρο, να επεμβαίνετε
με χαλκούχο σκεύασμα. Προσοχή στις φυτοτοξικότητες.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Μην υπερβαίνετε τις αναγραφόμενες δόσεις των σκευασμάτων.
2. Μην αναμιγνύετε περισσότερα από δύο σκευάσματα στο ίδιο ψεκαστικό διάλυμα.
3. Οι άκαιρες και χωρίς λόγο επεμβάσεις, επιβαρύνουν οικονομικά και ζημιώνουν το περιβάλλον.
4. **Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**
5. Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ